

Péče o dutinu ústní a osteonekróza čelisti

MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF MU a FN Brno

KOMPLIKACE LÉČBY MM

- × Nežádoucí účinky léčiv
- × Imunosuprese
- × Osteonekróza

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY LÉČIV

- × **Stomatitida** (Alkeran, Vincristin, Adriamycin/Doxorubicin)
 - + Prevence: úprava ostrých hran výplní, korunek, protéz; odstranění zubního kamene; nedráždivá strava
 - + Léčba: výplachy úst (Corsodyl, H₂O₂, Stopangin); hojivé a anestetické pasty (Solcoseryl, Mesocain, Kamistad, Mundisal)
- × **Bolesti čelistí** (Vincristin)

IMUNOSUPRESE

- × Fokální infekce: rozvoj zánětlivých komplikací z chronických ložisek
 - + Prevence: pečlivé vyšetření zubním lékařem před začátkem terapie
 - + Léčba: ATB, chirurgická terapie
- × Orální kandidóza
 - + Prevence: pečlivá ústní hygiena (včetně snímatelných protéz!)
 - + Léčba: antimykotika (i lokálně – endiaron)





R
VATECH







OSTEONEKRÓZA

- × Dusíkaté bisfosfonáty (kombinace s kortikoidy)
- × Hlavně po extrakci zubu
- × Pacienti s MM více ohroženi
- × Ložisko obnažené, mrtvé kosti
- × Často bolestivost
- × Riziko zlomeniny čelisti

OSTEONEKRÓZA


× Prevence

- + Vyšetření před aplikací bisfosfonátů
- + Ponechány jen zuby s dobrou prognózou
- + Při nutnosti extrakce vysazení bisfosfonátu (nejlépe min. na 3 měsíce) a ATB clona (min. 14 dní)

OSTEONEKRÓZA


× Léčba

- + V počátku výplachy (Corsodyl, H_2O_2 , Stopangin) a hygiena dutiny ústní
- + Ohlazení ostrých okrajů
- + Resekce postižené kosti
- + Dlouhodobě ATB
- + Hyperbarická oxygenoterapie











PÉČE O DUTINU ÚSTNÍ

- × Pečlivá běžná hygiena dutiny ústní
- × Měkké kartáčky
- × Mezizubní prostory



PÉČE O DUTINU ÚSTNÍ

- ✘ Antiseptické ústní vody (Corsodyl)
- ✘ Výplachy (H_2O_2)



DĚKUJI ZA POZORNOST