

VELCADE NA SLOVENSKU

Pavol Kotouček
Slovenská myelómová spoločnosť



CMG 2006 Velké Bílovice

Skúsenosti s liečbou VELCADE na Slovensku

Liečba vedená v centrách:	počty:
Banská Bystrica	9
Bratislava Klinika hematológie	27
Bratislava NOÚ	2
Košice	16
Martin	9

Kompletizovanie cyklov u „rodinných“ hematológov
pre zvýšenie kvality života pacienta



Skúsenosti s liečbou VELCADE na Slovensku

Celkový počet 63

Vyhodnotení pacienti 61

Liečebný protokol

- VELCADE monoterapia d1,4,8,11
6-8 cyklov: 21 dňové cykly

71%

- VELCADE + DEXAMETASON
d1,2,4,5,8,9,11,12

29%

Súbor pacientov

Počet n = 61

Pohlavie Ž 29 : M 32

Vek medián 60 rokov, interval 36-78

Klinické štádium D-S

I 2

II 10

III 49

Monoklonálna bielkovina

IgG 43

IgA 14

L'R 3

nesekrečný 1

Predliečení pacienti

Predchádzajúce línie

medián 2

priemer 2,8

Pacienti po autológnej transplantácii

n = 24 39%

Predliečený Thalidomidom

n = 7 11%



Výsledky liečby VELCADE: predliečení THALIDOMIDOM

CR	0	
PR	3	42%
MR	0	
SD	3	42%
PD	1	14%
Exitus	0	
NA	0	

Výsledky liečby VELCADE predliečením Thalidomidom

KR	0%
KR+PR	42%
KR+PR+MR	42 %
KR+PR+MR+SD	84 %

Výsledky liečby VELCADE predliečení autológnou transplantáciou

1x ASCT n = 9

CR		
PR	2	22%
MR	1	11%
SD		
PD	2	22%
Exitus		
NA	4	44%

2,3 x ASCT n = 16

CR		
PR	5	31%
MR	2	12%
SD	5	31%
PD		
Exi	2	12%
NA	2	12%

Výsledky léčby VELCADE predliečení ASCT

	ASCT 1	ASCT 2-3	Všetky ASCT
KR	0%	0%	0%
KR+PR	22%	31%	29%
KR+PR+MR	33%	43%	41%
KR+PR+MR+SD	33%	74%	62%

Výsledky liečby VELCADE celkovo - v 2. a ďalšej línii

CR	8	14%
PR	15 = 5 nCR+10 PR	22%
MR	4	7%
SD	7	12%
PD	4	7%
Exitus	5	9%
NA	18	29%

Výsledky léčby

KR	14%
KR+PR	36%
KR+PR+MR	43%
KR+PR+MR+SD	55%

Nežiadúce účinky

Neuropatia

Trombocytopénia

Slabosť

Kožné infiltráty

Ostatné



Neuropatia

Velcade navodil neuropatiu:

Gr. 1+2: n = 16 26%

Gr. 3+4: n = 14 22%

Celkom

48%

Vstupná neuropatia (Gr.1,2) 15 pacientov - 24%

Velcade túto neuropatiu zhoršil u 6 pacientov 40%

Prerušenie liečby 0-90 dní, medián 49, priemer 44

Cave: Neskorá neuropatia

3 mesiace po 8 cykle- 5mesiacov trvá



Trombocytopenia

Velcade induced thrombocytopenia:

Gr. 1+2:	n = 9	14%
Gr. 3+4:	n = 3	4%

Celkom

28%

Ostatné nežiadúce účinky

Neutro/leukopénie	2x	3%
Slabosť	11x	18%
Infekce	3x	4%
Herpes zoster	1x	1%
Kožní alergie	1x	1%
Kožné infiltráty	1x	1%
Ototoxicita	1x	1%
Úbytok hmotnosti	2x	3%

Záver:

VELCADE

Priniesol účinnú liečbu
pre relabujúcich pacientov

S celkovou odpoveďou	55%
Predliečení ASCT	62%
Predliečení THA	84%

Záver

VELCADE

Prevenca nežiadúcich účinkov

Kvalita života

1. Centrá + hematologické ambulancie
2. Polyneuropatie **B6, Thioctacid, Lyrica**
3. Herpes **valacyclovir**
4. Slabosť **výživa, anémia, DXM**



Pod'akovanie za zber a spracovanie dát tímu Janssen-Cilag Slovensko



Prof. Joan Bladé, Barcelona

Baňáková J.
Genserková H.
Markuljak I.
Wild A.
Bocková K.
Masárová K.
Mistrík M.
Štefániková Z.
Flochová M.
Fričová M.
Štecová N.
Švorcová E.
Tóthová E.



Pod'akovanie za celú SMS