

Velcade - Case report

- ◆ Iniciály: JM; Věk: 62 let; Pohlaví: muž
- ◆ Dg.: Mnohočetný myelom IgG kappa, kl.st. I.A
- ◆ Datum stanovení dg.: v r. 1996 ve Zlíně
- ◆ Stav před léčbou:
 - Status performance dle WHO: 100%
 - KO: leu $4,53 \times 10^9/l$, ery $4,07 \times 10^{12}/l$,
Hg 123 g/l, Plt $109 \times 10^9/l$
 - Hodnota M-Ig: 27,7 g/l

Prodělaná léčba

- ◆ V r. 1996 - 5 cyklů CHT VMCP + CCNU, UL IFN (1998), první relaps v r. 1998
- ◆ V r. 1998 - 4 cykly Vincristin, Doxorubicin, Dexametazon, Lomustin. UL INF 1998-99. Druhý relaps 2/03.
- ◆ Od 3/03 chemoterapie VAD 4 cykly s následnou stimulací a transplantací PBSC 5.12.2003. Třetí relaps 16.12.2004.

Aktuální jiná léčba

- ◆ Podpůrná léčba:
bisfosfonáty (Bonefos p.o.)

Podaná léčba

- ◆ I. Cyklus: 11.1.2005

Podaná dávka: 1,3 mg/m²

PLT: 109 x 10⁹/l (11.1.05)

113 x 10⁹/l (14.1.05)

96 x 10⁹/l (18.1.05)

177 x 10⁹/l (4.2.05)

- ◆ Nežádoucí účinky: od 18.1.-4.2.05 infekční komplikace, horečka nad 39°C, 1x zkolaboval, řešeno ve Zlíně.

Podaná léčba

◆ II. Cyklus: 14.2.2005

◆ Podaná dávka: 1,3 mg/m²

PLT: 117 x 10⁹/l (14.2.05)

93,5 x 10⁹/l (17.2.05)

62,6 x 10⁹/l (21.2.05)

41,6 x 10⁹/l (24.2.05)

◆ Nežádoucí účinky: Nevolnost, střevní dyskomfort ve smyslu nadýmání.

Podaná léčba

◆ III. Cyklus: 7.3.2005


◆ Podaná dávka: 1,3 mg/m²

PLT: 96,1 x 10⁹/l (7.3.05)

86,4 x 10⁹/l (10.3.05)

◆ Nežádoucí účinky: Od 11.3.05 - 21.3.05
hospitalizace na infekčním odd. pro pásový opar.

Vývoj M-Ig v průběhu léčby Velcadem



Ukončení léčby

- ◆ Dne 24.3.2005 ukončení pac. účasti ve studii na vlastní žádost. Celkem 3,5 cyklu.
- ◆ M-Ig: vstupně 27,7 g/l, po II. cyklu 25,7 g/l -
- bez léčebné odpovědi.